



PROVA ESCRITA – ENFERMAGEM

Questão 1

Segundo Ricci (2008), o período pós-parto abrange um tempo crítico de transição para a mulher, seu bebê e sua família em termos fisiológicos e psicológicos. O período pós-parto começa após a expulsão da placenta e dura aproximadamente seis semanas. Esse período também é conhecido como puerpério. Desta forma a conduta de Enfermagem durante o período puerperal começa de forma abrangente na primeira hora após a mulher dar à luz e continua até o momento da alta. Nesta perspectiva responda as questões abaixo:

- a- Cite cinco (5) sinais de perigo no pós-parto imediato (0,5 ponto).
- b- Indique seis (6) cuidados de Enfermagem com as mamas durante o período do puerpério imediato (1,0 ponto).
- c- Descreva cinco (5) condutas de Enfermagem no pós-parto cirúrgico (0,5 ponto).

Questão 2

A cetoacidose diabética é uma complicação aguda da diabetes mellitus. Dentre as causas é possível identificar dose insuficiente ou omissão de insulina, diabetes mellitus não diagnosticada ou não tratada, erros de administração da insulina e doenças agudas ou infecções.

- a) Sobre a cetoacidose diabética, descreva a sua fisiopatologia de forma a explicar o aparecimento das seguintes características clínicas: hiperglicemia, desidratação/perda de eletrólitos e acidose metabólica (1,0 ponto).



- b) Ao reconhecer que um indivíduo com diabetes mellitus, na presença de uma infecção, pode desenvolver cetoacidose metabólica, descreva cinco (5) orientações que devem ser seguidas pelo indivíduo, ao longo do período com a doença infecciosa, de forma a reduzir o risco ou minimizar o quadro clínico da cetoacidose diabética (1,0 ponto).

Questão 3

Um acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico, está relacionado a um suprimento sanguíneo deficitário para determinada parte do encéfalo. Pode ser causado por fatores de risco modificáveis e não modificáveis, sendo a prevenção primária a melhor abordagem.

- a) Destaque cinco (5) fatores de risco modificáveis para o AVE isquêmico (1,0 ponto).
- b) Não sendo possível a prevenção do AVE isquêmico, um diagnóstico rápido associado ao uso de medicamentos aumenta as chances de sobrevivência. Os agentes trombolíticos, como a t-PA podem ser utilizados no AVE isquêmico, na ausência de contraindicações. De forma a prevenir ou minimizar possíveis efeitos colaterais da t-PA, descreva cinco (5) cuidados de Enfermagem a serem realizados ao longo das primeiras 24 horas após o uso da medicação t-PA (1,0 ponto).

Questão 4

Considerando a prioridade dada à segurança do paciente em serviços de saúde na agenda política dos Estados-Membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) e na Resolução aprovada durante a 57ª Assembleia Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde publicou a PORTARIA Nº 529, DE 1º DE ABRIL DE 2013 para contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional.



- a) Cite os cinco (5) objetivos específicos instituído na PORTARIA Nº 529, DE 1º DE ABRIL DE 2013 (1,0 ponto).

- b) Cite as áreas indicadas pela na Portaria nº 529/2013 para que sejam propostas e validadas em protocolos, guias e manuais voltados à segurança do paciente e implantados em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional (1,0 ponto).

Questão 5

Segundo a Portaria nº 529/2013 do Ministérios da Saúde, a Cultura de Segurança configura-se a partir de cinco características operacionalizadas pela gestão de segurança da organização, dentre elas, “a cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares”.

- a) Considerando o Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente, defina o conceito de cultura justa (2,0 pontos).